

*Согласно предписанию о проведении дополнительных санитарно-профилактических (противоэпидемических) мероприятий от 12.11.2025г.
№66-10-17/11-20451-2025*

Меры по профилактике распространения ветряной оспы в образовательном учреждении

- Организация комплекса противоэпидемических мероприятий. В первые сутки с момента получения предписания организовать комплекс противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению эпидемического распространения ветряной оспы в образовательном учреждении и обеспечить его выполнение в течение 21 дня с момента изоляции из коллектива последнего больного.
- Режимно-ограничительные мероприятия. Организовать в образовательном учреждении проведение режимно-ограничительных мероприятий (срок: в течение 24 часов с выявления случая заболевания ветряной оспой/опоясывающим лишаем):
 - I. Прекратить прием новых и временно отсутствовавших детей, не болевших ветряной оспой и не привитых против этой инфекции, в группу (коллектив), где зарегистрирован случай заболевания ветряной оспой.
 - II. Запретить участие в массовых мероприятиях детей из группы (коллектива), в котором выявлены случаи заболеваний, а также перевод детей такой группы в другие группы (коллективы).
 - III. При регистрации случаев заболевания ветряной оспой в разных группах/классах запретить массовые мероприятия в образовательном учреждении.
 - IV. Организовать в коллективе своевременное выявление больных ветряной оспой, а также случаев заболеваний, подозрительных на эту инфекцию, изоляцию из организованного коллектива (при необходимости госпитализация больного) (срок: немедленно при выявлении). (Дети в возрасте старше 7 лет и лица, ранее переболевшие ветряной оспой, разобщению не подлежат.)
- Выявление лиц для экстренной профилактики. Организовать выявление лиц, не болевших и не привитых против ветряной оспы, для проведения экстренной профилактики во всем учреждении (срок: в течение 24 часов с момента выявления больного или получения информации о заболевании).
- Активная иммунизация. Организовать активную иммунизацию против ветряной оспы детям (в возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины, в первые 72–96 часов после вероятного контакта с больным ветряной оспой.
- Медицинское наблюдение. При наличии среди контактных лиц, не болевших ветряной оспой, не привитых и (или) не получивших заверченный курс

вакцинации против ветряной оспы, за ними устанавливается медицинское наблюдение сроком на 21 календарный день с момента изоляции последнего заболевшего. Медицинское наблюдение за детьми и взрослыми, переболевшими ветряной оспой, а также получившими завершённый курс вакцинации против ветряной оспы (при наличии документального подтверждения), не проводится.

- Ежедневные осмотры. С целью активного выявления больных ежедневно в период проведения противоэпидемических мероприятий организовать проведение осмотров детей и взрослых, не болевших ветряной оспой, не привитых и (или) не получивших завершённый курс вакцинации против ветряной оспы (оценка общего состояния, осмотр кожных покровов, измерение температуры тела), контактировавших с источником возбудителя ветряной оспы, с фиксацией результатов в медицинской документации (срок: 21 день с момента изоляции последнего заболевшего).
- Влажная уборка помещений. Организовать проведение дважды в день влажной уборки всех помещений с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств, при необходимости более часто (срок: 21 день с момента изоляции последнего заболевшего).
- Дезинфекция воздушной среды. Организовать проведение дезинфекции воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей, с использованием рециркуляторов непрерывного действия в присутствии людей (срок: 21 день с момента изоляции последнего заболевшего).
- Проветривание помещений. Организовать не менее четырех раз в день проветривание (по 8–10 минут) всех помещений, в теплое время года — сквозное проветривание (срок: 21 день с момента изоляции последнего заболевшего).
- Контроль личной гигиены. Организовать контроль соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и детьми группы (коллектива)/класса с использованием антибактериального мыла и кожных антисептиков (срок: 21 день с момента изоляции последнего заболевшего).
- Информирование коллектива. Организовать информирование детей, взрослых членов коллектива, а также законных представителей детей о мерах профилактики ветряной оспы, необходимости немедленного информирования об

ухудшении состояния здоровья и контакте с больными, подозрительными на ветряную оспу/опоясывающий лишай за пределами коллектива, о наиболее эффективном методе профилактики: вакцинации против ветряной оспы (срок: в течение всего периода проведения противоэпидемических мероприятий).

- Допуск реконвалесцентов. Допуск реконвалесцента ветряной оспы в коллектив (группу/класс) разрешается после его клинического выздоровления, но не ранее шестого дня со времени появления последнего свежего элемента сыпи независимо от наличия вторичных случаев ветряной оспы в очаге и только при наличии справки об отсутствии медицинских противопоказаний для посещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных организаций.

Основные мероприятия по профилированию и контролю ветряной оспы:

1. Немедленные действия (в первые сутки):

Организация комплекса мероприятий для предотвращения распространения, включая выявление и изоляцию больных.

Продолжение профилактики в течение 21 дня после последнего случая.

2. Ограничения и запреты (с 24 часов):

Прекращение приема новых и отсутствующих детей, не болевших или не вакцинированных.

Запрет массовых мероприятий внутри коллектива/класса с выявленными случаями.

Перевод детей в другие группы, при необходимости.

3. Выявление и изоляция:

Немедленное выявление заболевших и подозрительных случаев.

Температурный контроль, осмотр кожных покровов.

Изоляция заболевших (госпитализация при необходимости).

4. Профилактика среди контактных лиц:

Выявление не болевших и не вакцинированных детей и взрослых для проведения экстренной профилактики.

Проведение вакцинации в первые 72–96 часов после контакта.

Медицинское наблюдение за контактными (21 день), за исключением переболевших и вакцинированных с подтверждением.

5. Дезинфекция и дезинструкция:

Регулярная влажная уборка (два раза в день), использование дезинфицирующих средств.

Проведение ультрафиолетовой обработки воздуха или других разрешённых методов.

Проветривание помещений (несколько раз в день, сквозное в зимнее время).

6. Контроль личной гигиены и информирование:

Контроль соблюдения правил личной гигиены с использованием антисептиков.

Информирование сотрудников, детей и родителей о мерах профилактики, необходимости обращения при ухудшении состояния.

7. Возвращение в коллектив:

Разрешение реконвалесцента после клинического выздоровления и не ранее шести дней после последнего элемента сыпи, при наличии справки.